

ЗАМЕТКИ

УДК 598.742 (574)

Азиатский козль (*Eudynamys scolopacea*) – новый вид в авифауне Туркменистана и Средней Азии

На крайнем юго-востоке Туркменистана, у подножья западного макросклона хребта Кугитангтау (Койтендаг) в долине Койтендарьи (окраина посёлка Ходжакараул) 8-10 мая 2013 г. зарегистрирована одиночная самка азиатского козля. Птица держалась на небольшом участке с молодыми всходами люцерны и посадками шелковицы, маклюры, карагача и сливы. Была молчалива, чаще садилась на деревья шелковицы, плодами которой и питалась. На том же участке найдено гнездо с кладкой длиннохвостого сорокопута, а из других птиц зарегистрированы индийские воробьи (4 колонии в кронах карагачей и под крышами соседних строений), кольчатые и малые горлицы (соответственно, 1 и 2 пары), маскированная трясогузка (1 пара).



Позже, 14 мая козль был найден мертвым с пробитой грудью с правой стороны и уже подсохший. Причина гибели неизвестна, видимо, птица была убита (из рогатки?) одним из местных подростков, на участке которого растет шелковица. Состояние яичника, к сожалению, изучению не поддавалось. Основные промеры таковы (мм): крыло – 180, хвост – 174, цевка – 30, клюв – 27 (от лба) и 21 (от ноздри). Как известно, азиатский козль – птица открытого ландшафта, ведет оседлый образ жизни, но, по-видимому, и кочует. Ближайшие районы распространения в восточных частях Пакистана находятся не менее чем 700 км от места нашей находки. Залет азиатского козля в Туркменистан (не исключено, что могли быть залеты на север Афганистана и крайний юг Узбекистана) пополняет список авифауны не только Туркменистана, но и всего среднеазиатского региона.

Е.Н. Агрызов, Ш.М. Менлиев, Э.А. Рустамов
Министерство охраны природы Туркменистана

УДК 598.815 (574)

**Амурский свиристель (*Bombycilla japonica*) – новый вид
в фауне Казахстана и Средней Азии⁷**

В годы массовой зимовки обыкновенных свиристелей на юго-востоке Казахстана среди алматинских птицеловов иногда возникали слухи о том, что кто-то из них поймал необычного краснохвостого свиристеля. Нам известен только один достоверный случай поимки амурского (японского) свиристеля *Bombycilla japonica* (Siebold, 1826) в Алматы. Лет семь назад житель микрорайона «Дружба» Ахвар Хамидулин поймал у себя в саду свиристеля с морковно-красным, а не желтым ленточным пятном на конце хвоста и красными пятнами на крыльях. Необычного свиристеля видели в уличном вольере А. Хамидулина несколько знакомых нам птицеловов. К сожалению, птица вскоре погибла, а ее труп был выброшен. Никто из профессиональных орнитологов этого свиристеля не видел, птица не была сфотографирована. По этим причинам достоверность залета в Казахстан амурского свиристеля тогда осталась под сомнением.

Необычно снежной и морозной зимой 2012/13 г. многочисленные стаи свиристелей вновь появились в Алматы и ее окрестностях. Один из авторов, Денис Афанасьев, 3 января 2013 г. наблюдал кормежку большой стаи свиристелей на горных дачах в районе Каменского плато (южная окраина города). Временами птицы садились на деревья неподалеку от наблюдателя и расклевывали оставшиеся с осени на ветвях мерзлые яблоки. Во время кормежки одной из таких стаяк он услышал не обычное «свиристение», а какие-то хрюкающие звуки, издаваемые свиристелями. Это несколько удивило его, но особого значения он им не придал. Птицы были доверчивы и подпускали осторожно идущего человека на 2-3 метра, что позволило разглядеть среди обыкновенных свиристелей амурского и поймать его с помощью петли, укрепленной на длинной палке. При содержании амурского свиристеля в клетке выяснилось, что он отличается от обыкновенного не только красным цветом на хвосте, на крыльях и подхвостье, но и заметно меньшими размерами. Вместо обычного «свиристения» пойманная птица издавала своеобразные «хрюкающие» звуки.

Через несколько дней, после того как амурский свиристель немного привык к неволе, он был показан одному из лучших фаунистов Казахстана О.В. Белялову. Птица была сфотографирована. Её фотография и комментарии к ней казахстанских орнитологов были размещены на сайте www.birds.kz. Среди алматинских птицеловов и любителей клеточного содержания певчих птиц провели специальный опрос, подтвердивший, что никому из любителей не известно, чтобы в последние годы кто-нибудь содержал амурских свиристелей. Следовательно, случайный выпуск в природу этой птицы исключен. С учетом этих обстоятельств факт залета амурского свиристеля в Казахстан можно считать доказанным.

Д.В. Афанасьев, В.Н. Дворянов

⁷ Перепечатано из: «Русский орнитологический журнал» 2013. Том 22. Экспресс-выпуск 839. Стр. 152-154). – Ред.

УДК 598.822 (574)

Нахождение майны (*Acridothores tristis*) в Караганде

Вот уже 50 лет продолжается активное расселение майны на северо-запад и восток Казахстана (Ковшарь, 1963; Ковшарь, Березовиков, 2001; Березовиков, 2001), однако её продвижение на север через центральные районы республики вдоль линии железной дороги от Балхаша до Караганды и Астаны происходило крайне медленно. Отдельные залеты майн севернее оз. Балхаш регистрировались в июне 1982 г. на ст. Агадырь (Сема, Гисцов, 1984), в июне 1984 г. в Центральной Бетпак-Дале (Ковшарь, 1984; в конце мая 1987 и в июне 1990 гг. в Кургальджинском заповеднике (Андрусенко, 2002), в августе 1995 г. в пос. Кургальджино (Ерохов, Березовиков, 2001). Однако на гнездовье в те годы она закрепилась только на северном побережье Балхаша, где на железнодорожной станции Сарышаган в августе 1988 г. наблюдалось несколько птиц, а 24 июля 1998 г. отмечен выводок из 5 особей. В городах Караганда и Астана она до последнего времени не регистрировалась. В этой связи представляет интерес её нахождение в г. Караганде, где 14 июля 2013 г. около торгового комплекса «Автомир. Технодром» мной наблюдалась взрослая майна. Птица кормилась среди мусора на многолюдном участке у станции технического обслуживания, а затем улетела под крышу одного из магазинов. Не исключено, что в настоящее время майны уже единично живут и размножаются в этом городе.

Андрусенко Н.Н. Дополнения к списку птиц Кургальджинского заповедника//Selevinia, 2002. С. 122-126. **Березовиков Н.Н.** Дополнения и уточнения к орнитофауне Утв-Илекского междуречья//Мат-лы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2001. С. 17-20. **Ерохов С.Н., Березовиков Н.Н.** Летняя орнитофауна озёр Кургальджинского заповедника//Мат-лы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2001. С. 70-84. **Ковшарь А.Ф.** Майна в Южном Казахстане//зоогеография суши (Тез. 3-го Всесоюз. Совещания по зоогеографии суши). Ташкент, 1963. С. 133. **Ковшарь А.Ф.** Майна у северных пределов Средней Азии//VIII Всесоюзная зоогеографическая конференция. Тез. докл. М., 1984. С. 72-74. **Ковшарь А.Ф., Березовиков Н.Н.** Тенденции изменения границ ареалов птиц в Казахстане во второй половине XX столетия//Selevinia, 2001. С. 33-52. **Сема А.М., Гисцов А.П.** Расселение майны в Казахстане//Орнитология. М., 1984. Вып. 19. С. 211-212.

Н.Н. Березовиков

УДК 598.826 (574.245)

О залете белокрылых клестов в Северо-Казахстанскую область в 2013 г.

Белокрылый клест *Loxia leucoptera* (Gmelin, JF, 1789) широко распространён по Уралу и в Западной Сибири. Гнездится в северной и частично средней тайге, в лесотундре и лесах крайнего юга тундры. На востоке ареала спускается в более низкие широты – к южным горам (Рябицев, 2008).

Для территории Казахстана белокрылый клест является очень редкой залетной птицей. До настоящего времени было известно всего 4 документально не подтвержденных встречи. Первые упоминания имеются в 5-томнике «Птицы Казахстана» (Ковшарь, 1974): птица была поймана птицеловом в 20-х числах ноября 1971 г. под Семипалатинском. Следующая неподтвержденная встреча датируется 19 августа 1999 г., когда в районе оз. Султанкельды (Кургальджинский заповедник) немецкий орнитолог Heinicke наблюдал молодую птицу с просветлениями на крыльях. Третьей была встреча стайки клестов с яркими белыми пятнами на крыльях на

оз. Шангин в 2002 г. (Белялов, 2002). Четвёртой была публикация С.В. Старикова о залете белокрылых клестов на Южный Алтай (Стариков, 2009).

Спустя 4 года после последней встречи, этих редких птиц посчастливилось увидеть и мне – 18 декабря 2013 г. во второй половине дня 4 белокрылых клеста (2 самца, самка и 1 вероятно молодая птица) кормились на лиственницах у Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева (г. Петропавловск). Птицы активно перемещались, перелетая с дерева на дерево, срывали шишки лиственницы, расклевывали и доставали семена. В это время удалось получить несколько достаточно хороших фотографий, на которых хорошо видны видовые признаки (см. цветные фото на обороте обложки).

Белялов О.В. Верховья реки Бухтарма//Каз.орнитол. бюлл. 2002. Алматы, 2002. С. 41.
Ковшарь А.Ф. Род Клест-Loxia//Птицы Казахстана, том 5. Алма-Ата, 1974. С. 320-331. **Рябицев В.К.** Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. Екатеринбург, 2008. 633 с. **Стариков С.В.** Зимний залет белокрылых клестов на Южный Алтай//Каз. орнитол. бюлл. 2008. Алматы, 2009. С. 231.

*И.А. Зубань,
г. Петропавловск*

УДК 598.842 (574-20)

Первая зимняя встреча синехвостки *Tarsiger cyanurus* в Казахстане

На площади Республики в центре г. Алматы 19 декабря 2013 г. встречена и сфотографирована самка синехвостки *Tarsiger cyanurus* (А. Исабеков, www.birds.kz).

Синехвостка была встречена около 16 час сидящей на открытых ветвях сирени на высоте около 1.5 м от земли. Спугнутая прохожими, она улетела, но через 20 минут вернулась на прежнее место, где наблюдалась еще примерно в течение 5 минут. Все это время птица держалась самых нижних ветвей двух лип и сирени, время от времени слетая на ствол липы, где пыталась найти корм. Место встречи находится в парковой зоне, в непосредственной близости от пешеходных дорожек. За два дня до этого выпал снег и температура воздуха днём была – 4°C. Рядом с синехвосткой держались зарянка, большие синицы, юрки и чёрный дрозд. Это первая встреча синехвостки в Казахстане в зимнее время.

На гнездовании в Казахстане синехвостка встречается только на Алтае (Щербаков, 2002; Березовиков, Рубинич, 2012). Залёты отмечены в осенний период под Кустанаем (Гептнер, 1925), под Семипалатинском (Селевин, 1930), в Кургальджино (Кривицкий и др., 1985), на Иргизе (Тимошенко, 2012), в Бетпак-Дале (А. Виляев, www.birds.kz), близ Алматы (В. Федоренко, www.birds.kz).

Березовиков Н.Н., Рубинич Б. Орнитологические находки в Восточном Казахстане//Рус. орнитол. журн. 2012. Т. 21. Экспресс выпуск 742. С. 885-697. **Гептнер В.Г.** Новые данные по авифауне севера Тургайской области//Бюл. МОИП. 1925. Нов. сер. Отд. биол. Т. 33, 1/2. С. 154-187. **Кривицкий И.А., Хроков В.В., Волков Е.Н., Жулий В.А.** Птицы Кургальджинского заповедника. Алма-Ата. 1985. 195 с. **Селевин В.А.** Сводка семилетних (1921-1927 гг.) фенологических наблюдений в окрестностях Семипалатинска//Вестн. Центр. музея Казахстана Вып. 1. 1930. С. 31-54. **Тимошенко А.Ю.** Первая регистрация синехвостки *Tarsiger cyanurus* в актюбинских степях на западе Казахстана осенью 2011 года//Рус. орнитол. журн. 2012. Т. 21. Экспресс выпуск 717. С. 33-34. **Щербаков Б.В.** Синехвостка на Западном Алтае//Selevinia-2002: 317-318.

*Аскар Исабеков
Алматы*

УДК 598.412 (574)

Встреча чирка клоктуна (*Anas formosa*) в Южном Прибалхашье

Клоктун (*Anas formosa*) – восточносибирская речная утка, отмечена для территории Казахстана как очень редкий залетный вид. В течение XX в. был отмечен всего несколько раз. Одиночных клоктунов добывали на Иртыше, близ Усть-Каменогорска, в Зайсанской котловине и у впадения Келеса в Сырдарью (Зарудный, 1915; Долгушин, 1960; Гаврилов, 1999; Ковшарь, 2012; В. Ковшарь, 2012).

В низовьях р. Каратал (Южное Прибалхашье) 14 октября 2013 г., был добыт одиночный молодой самец, имеющий следующие промеры: масса – 350 г; крыло – 217; хвост – 75; плюсна – 35; клюв 38/30 мм. В это время здесь держалась относительно теплая погода (до +22° днем) и шёл небольшой пролет шилохвости (*Anas acuta*), кряквы (*Anas platyrhynchos*), свистунка (*Anas crecca*), голубой чернети (*Aythya ferina*) и гоголя (*Bucephala clangula*).

Гаврилов Э.И. Фауна и распространение птиц Казахстана. Алматы, 1999. С. 21.
Долгушин И.А. Птицы Казахстана Т.1. Алма-Ата, 1960. 470 с. **Зарудный Н.А.** Краткий очерк охотничьего промысла Сыр-Дарьинской области//Туркест. Сельское хоз-во. 1015. №7. С 668-676; № 8. С. 756-778. **Ковшарь А.Ф.** Ревизия орнитофауны и современный список птиц Казахстана//Орнитол. вестник Казахстана и Ср. Азии. Вып.1. Алматы, 2012, С. 51-70.
Ковшарь В.А. Род Речные утки- *Anas*//Фауна Казахстана, Т.2. Выпуск 1. Алматы, 2012, С. 246-304

Ф.Ф. Карнов

УДК 598.331 (574)

Долина р. Борохудзир – новое место гнездования серпоклюва (*Ibidorhyncha struthersii*) в Джунгарском Алатау

Впервые в Джунгарском Алатау серпоклюв был найден на гнездовании в 1964 г. в низовьях р. Тентек (Грачев, 1965). В настоящее время для восточной части хребта известно обитание нескольких пар в бассейнах рек Тентек и Лепсы (Березовиков, Рубинич, 2001; Ковшарь и др., 2002; Березовиков, Анненков, 2009). Гнездование серпоклюва в западной части хребта предполагалось на основании встреч птиц в зимнее время на реках Каратал и Усек, уже в предгорной зоне (Шнитников, 1949, Долгушин, 1962). Поиски птиц на галечниках в ущелье р. Коксу результатов не дали (Ковшарь и др., 2002), но ниже по течению реки (1290 м), уже после выхода её из гор, 22 июля 2012 г. встречен нераспавшийся выводок – две взрослых птицы с четырьмя молодыми (Березовиков, 2012).

Одним из подходящих мест для гнездования серпоклюва всегда считались большие галечники в верховьях реки Борохудзир, на что могли указывать зимние встречи на соседней р. Усек. Но, несмотря на то, что эти места неоднократно посещались многими орнитологами и даже производился специальный облёт галечников Борохудзира на вертолёте (А.Ф. Ковшарь, устн. сообщ.) обнаружить здесь птиц не удавалось.

Нами получены сведения, доказывающие наличие в этом районе гнездящейся популяции. Взрослая птица была сфотографирована 26 августа 2007 г. в русле р. Борохудзир (800 м) на окраине пос. Аулиеагаш (А.В. Коваленко, www.birds.kz). 18 июня 2011 г. взрослая птица встречена на ручье Сарлытан (1950 м), 21 октября 2012 г. 6 птиц (2 взрослые с нераспавшимся выводком) встречены в урочище Аяксай (1800 м) в

верховьях Борохудзира (А.В. Коваленко, Г.Ю. Дякин, www.birds.kz) и одиночка сфотографирована там же 30 июня 2013 г. (Г.Ю. Дякин, www.birds.kz). Стоит отметить, что в летнее время долина верхнего течения Борохудзира интенсивно используется под пастбища. Фактор беспокойства здесь имеет очень высокий уровень. Это отражается на поведении серпоклювов, которые ведут себя очень скрытно. Возможно, из-за этого их и не удавалось обнаружить прежде.

Березовиков Н.Н. Нахождение выводка серпоклюва *Ibidorhyncha struthersii* на реке Коксу в северных отрогах Джунгарского Алатау//Русский орнитологический журнал 2012. Т. 21. Экспресс-выпуск № 789. С. 2081-2085. **Березовиков Н.Н., Анненков Б.П.** Новые находки серпоклюва в Джунгарском Алатау//Selevinia 2009. С. 227. **Березовиков Н.Н., Рубинич Б.** Находка серпоклюва *Ibidorhyncha struthersii* в восточной части Джунгарского Алатау//Русский орнитологический журнал 2001. Т. 10. Экспресс-выпуск № 161. С. 835. **Грачев В.А.** Новые находки серпоклюва в Тянь-Шане//Новости орнитологии (Мат-лы 4-й Всесоюз. орнитол. конфер.). Алма-Ата, 1965. С. 97-99. **Долгушин И.А.** Отряд кулики//Птицы Казахстана, Алма-Ата, т. 2. 1962. С. 40-245. **Ковшарь А.Ф., Ланге М., Торопова В.И.** Орнитологические наблюдения джунгаро-кетменской зоологической экспедиции «Казахстан-2002»//Selevinia 2002. С. 109-121. **Шнитников В.Н.** Птицы Семиречья. М.-Л., 1949. 665 с.: илл., карт.

А.В. Коваленко, Г.Ю. Дякин

УДК 598.414 (574.12)

Встречи малых лебедей (*Cygnus bewickii* Yarell, 1830) на Северном Каспии

Традиционно считалось, что малый лебедь встречается на пролете только в восточной части Казахстана (Долгушин, 1960; Гисцов, 2006), хотя в обеих обзорных работах упоминаются случаи добычи шкурок этой птицы в Приаралье, а также содержится указание С.Н. Варшавского (1987) на 2 встречи пролетных групп этого вида в Северном Прикаспии за 15 лет наблюдений. За последние годы птиц этого вида неоднократно наблюдали во время осеннего пролета на озерах северного Казахстана. Например, в 1999 г. на оз. Кулаголь с 14 сентября по 13 октября, мы регулярно отмечали стайки малых лебедей от нескольких особей до полутора сотен только уверенно определенных, остальные не определялись до вида из-за дальности нахождения или условий освещения, причем численность малых лебедей местами превышала суммарную численность шипунов и кликунов (см. краткое сообщение в настоящем выпуске).

В последние годы стайки и семейные группы малых лебедей сфотографированы и выставлены на сайте www.birds.kz из Северо-Казахстанской (И. Зубань) и Кустанайской (А. Тимошенко) областей, здесь же находятся зимние снимки с Шардаринского вдхр. (А. Коваленко). В начале марта 2012 г. Кыдыр Айсагали сфотографировал молодого малого лебедя в районе Форта Шевченко (Мангистау).

На полях испарения пос. Тенгиз (Северный Каспий) 12 октября 2013 г. мною были сфотографированы 4 малых лебедя, которые держались среди других водоплавающих. Здесь же кормилось 4 шипуна и одиночный кликун. Погода была теплой, на водоеме было отмечено 23 вида водоплавающих и 10 видов околоводных птиц, среди которых такие теплолюбивые виды как савка (12 особей), большой веретенник (8), наравне с северными – гоголь (8) и морянка (1). В тростниковых зарослях по берегу держались сотенные стаи пролетных зябликов и юрков (не менее 3 тысяч суммарно). Малые лебеди отдыхали на мелководье рядом с другими лебедями, но держались обособленно, после появления людей взлетели и довольно долго с криком

летали над наблюдателями, словно оценивая степень угрозы, затем улетели в южном направлении.

Скорее всего, малые лебеди в казахстанской части Северного Каспия – явление не такое уж редкое, как и в других частях Казахстана, просто этот вид не всегда определяют. Наши собственные исследования в течение ряда последних лет, регулярные аэровизуальные учеты, не дают нам возможность рассматривать птиц вблизи, чтобы с уверенностью определять малых лебедей. Однако, еще одна возможная причина участвовавших встреч этого лебедя в Западном Казахстане – некоторый подъем численности вида и в местах его зимовок. Г.М. Русанов (2011), проработавший в дельте Волги несколько десятилетий, пишет, что этот лебедь отмечался крайне редко в 70-х гг. XX ст., когда его изредка находили среди кликунов, отловленных для зоопарков. В последние десятилетия его единично встречали не чаще одного раза в 3-4 года. Но зимой 2009/10 г. обнаружено скопление малых лебедей в Волго-Ахтубинском междуречье, где на небольшом оз. Давыдкино в различные посещения насчитывалось от 200 до 900 этих птиц. Учитывая то, что дельта Волги входит в единый экологический комплекс Северного Каспия, можно предположить, что и на казахстанской части побережья он также бывает чаще, чем известно документированных встреч.

Варшавский С.Н. Пролет лебедей в Северном Приаралье и Северном Прикаспии и некоторые особенности его в разные годы // Экология и миграции лебедей в СССР. М. 1987. С. 119-121. **Долгушин И.А.** Малый лебедь // Птицы Казахстана. Т.1. С. 255-256. **Гисцов А.П.** Малый лебедь // Птицы Средней Азии. Т.1. 2006. С. 169-171. **Русанов Г.М.** Птицы нижней Волги. Астрахань, 2011. 390 с.

В.А. Ковшарь

УДК 598.841 (574)

О гнездовании ополовника (*Aegithalos caudatus*) в Заилийском Алатау

Ещё в начале XX в. ополовник в Семиречье был известен лишь по четырём зимним экземплярам – трём из Джунгарского Алатау и одному с Текеса (Шнитников, 1949). И.А. Долгушин (1972) к середине 60-х гг. имея эту же информацию, предполагал, что всё это кочующие птицы из приграничных районов Китая и написал – «Не будет ничего удивительного, если эта птица окажется гнездящейся в предгорьях Джунгарского Алатау и Кетменя в пределах Казахстана». В 1982 г. выводок был встречен С.Л. Складенко в Джунгарском Алатау возле с. Тополёвка (Гаврилов, 1999). Видимо, в последние десятилетия началось быстрое расселение ополовника в западном направлении. В начале 2000-х несколько орнитологов встречали выводки в Чарынской ясеновой роще (Складенко, 2002; Гаврилов, 2002; Ковшарь, 2002). В это же время выводки отмечены и в каньоне р. Темирлик (О.В. Белялов, устн. сообщ.). На оз. Иссык-Куль выводок встречен 18 июля 2001 г. (Кулагин, 2003). Первые редкие встречи в окрестностях Алма-Аты отмечены в осенне-зимний период в конце 80-х гг. (А.В. Панов, устн. сообщ.). К началу XXI в. ополовники стали регулярно появляться в период кочёвок в Заилийском Алатау (Коваленко, 2002; Гусенко, 2002; Дворянов, 2002; О.В. Белялов, устн. сообщ.) и в долине р. Или (Губин Б.М., А.В. Панов, устн. сообщ.). Впервые выводок ополовников составлявший группу из 13-15 птиц наблюдался с 8 августа по 8 ноября 2009 г. в Турарском дачном массиве (Левин, 2009) и предполагалось, что гнездование здесь маловероятно, а птицы прикочевали либо из Заилийского Алатау (20-30 км), либо из поймы р. Или (60-70 км).

В начале апреля 2013 г. несколько птиц наблюдалось в окрестностях соколиного питомника «Сункар» в Большом Алматинском ущелье (А. Коваленко, www.birds.kz). Здесь, в роще грецкого ореха (1600 м) 5 мая 2013 г. пара птиц строила гнездо в развилке ствола ореха на высоте 8 м от земли. При последующих проверках оно оказалось недостроенным и было брошено. Видимо, птицы построили гнездо в другом месте, но где-то рядом, так как 20 июня был встречен нераспавшийся выводок из восьми молодых птиц и двух взрослых. Стайки их регулярно встречались в окрестностях питомника до начала декабря.

Гаврилов Э.И. Фауна и распространение птиц Казахстана. Алматы, 1999. 198 с. **Гаврилов Э.И.** Краткое сообщение о длиннохвостой синице//Каз. орнитол. бюлл., 2002. Алматы, 2002. С. 112. **Гусенко В.В.** Краткое сообщение о длиннохвостой синице//Каз. орнитол. бюлл., 2002. Алматы, 2002. С. 112. **Дворянов В.Н.** Краткое сообщение о длиннохвостой синице//Каз. орнитол. бюлл., 2002. Алматы, 2002. С. 112. **Долгушин И.А.** Семейство ополовниковые//Птицы Казахстана, Алма-Ата, т. 4. 1972. С. 230-242. **Коваленко А.В.** Краткое сообщение о длиннохвостой синице//Каз. орнитол. бюлл., 2002. Алматы, 2002. С. 112. **Ковшарь А.Ф.** Краткое сообщение о длиннохвостой синице//Каз. орнитол. бюлл., 2002. Алматы, 2002. С. 112. **Кулагин С.В.** Гнездящиеся птицы Иссыккульского заповедника//Биосферная территория «Ысык-Куль». Бишкек, 2003. С. 84-85. **Левин А.С.** Орнитологические сукцессии 1988-2008 гг. на дачном участке в полупустыне близ Алматы и встречи здесь выводка ополовников (*Aegithalos caudatus*)//Selevinia 2009. С. 208. **Скляренко С.Л.** Краткое сообщение о длиннохвостой синице//Каз. орнитол. бюлл., 2002. Алматы, 2002. С. 112. **Шнитников В.Н.** Птицы Семиречья. М.-Л., 1949. 665 с.

П.В. Пфандер, И.С. Шмыгалева

УДК 598.2/9 (574)

Дополнения к видовому составу птиц Западно-Алтайского заповедника

Последним трудом, обобщившим научно-исследовательские работы по выяснению видового состава птиц на современной территории Западно-Алтайского государственного природного заповедника, является работа «Фауна птиц Западно-Алтайского заповедника» Б.В. Щербакова и Н.Н. Березовикова (2007). Согласно ей на территории заповедника достоверно отмечено 150 видов птиц, из которых 129 гнездящихся.

В настоящий момент, к июлю 2013 г., этот список можно дополнить за счёт наблюдений сотрудников заповедника, а также исследовательских работ А.П. Цыганова за 2007-2008 гг., следующими 10 видами.

Баклан (*Phalacrocorax carbo*). По сообщению инспектора охраны Ф.Г. Коробейникова, встречен на р. Чёрная Уба (район водопада «Коварный») 12 августа 2011 г.

Чёрный гриф (*Aegypus monachus*). Выше истоков р. Палевской Разливанки 14 июля 2013 г. мы наблюдали птицу, кружившуюся в небе над Сухим перевалом и улетевшую в южном направлении.

Белоголовый сип? Кумай? (*Gyps* sp.). На Коксинском хребте 21 мая 2002 г. А.В. Таран наблюдал хищную птицу рода *Gyps*, слетевшую с Савугина камня. Верх птицы светло-коричневый, низ светлый. Грудь в продольных пестринах тёмно-коричневого, почти чёрного цвета. Птица быстро улетела в сторону солнца, кругами набрала высоту и скрылась из виду.

Зимородок (*Alcedo atthis*). По сообщению инспектора охраны Ф.Г. Коробейникова, встречен на реке Чёрная Уба (район «Ларей») 08 августа 2011 г.

Седой дятел (*Picus canus*). По сообщению А.П. Цыганова, встречен 26 февраля 2008 г. на южном склоне Линейского хребта в западной оконечности Черно-Убинской впадины, в 2 км на запад от Черно-Убинского кордона,

Большой пёстрый дятел (*Dendrocopos major*). На западном склоне Коксинского хребта, 150-200 м выше по склону от дороги на кордон «Кокса», 26 октября 2012 г. я наблюдал, как дятел кормился на стеблях бодяка, проделывая в них аккуратные округлые отверстия. А 28 февраля 2008 г. в елово-берёзовом лесу в Черно-Убинской впадине этого дятла встретил А.П. Цыганов.

Кукша (*Perisoreus infaustus*). Встретилась мне 20 октября 2002 г. в елово-кедровом лесу на западном склоне Коксинского хребта (район «ворот»).

Розовый скворец (*Sturnus roseus*). Группа сотрудников научного отдела во главе с Н.В. Преминой 7 июня 2012 г. встретила стайку из 4 птиц перед мостом через р. Чёрная Уба (левый берег). При приближении машины, скворцы взлетели с земли и скрылись в кроне рядом стоящей ели.

Овсянка Годлевского (*Emberiza godlewskii*). По сообщению А.П. Цыганова, 30 сентября 2008 г. четыре птицы встречены на открытых лугово-кустарниковых участках Черно-Убинской впадины. Хотя эта овсянка уже включена в видовой состав птиц ЗАГПЗ, о данной находке необходимо упомянуть, так как её обнаружили непосредственно на территории заповедника (в отличие от предыдущей находки на сопредельной с заповедником территории).

Таким образом, в настоящее время орнитофауна Западно-Алтайского государственного природного заповедника насчитывает 157 видов птиц.

Цыганов А.П. 2008. Отчёт о работе Цыганова А.П. по теме: «Видовой состав и ландшафтное распределение птиц Западно-Алтайского заповедника». **Щербаков Б.В., Березовиков Н.Н. 2007.** Фауна птиц Западно-Алтайского заповедника. Труды Западно-Алтайского государственного природного заповедника. Том 1.

А.В. Таран
Западно-Алтайский заповедник

УДК 598.842 (574)

Встреча синей птицы (*Myophonus caeruleus*) на р. Сырдарья

Синяя птица (*Myophonus caeruleus*) гнездится в Тянь-Шане, там же не ежегодно зимует. Ранее вне гор и предгорий ее не отмечали. 28 октября 2013 г. в течение часа перед заходом солнца ее несколько раз слышали в туранговом лесу по правому берегу р. Сырдарья (район моста по автотрассе г. Туркестан – с. Балтаколь). Ближайшее место гнездование этой птицы – р. Боролдай (Боролдайтау) расположено в 200 км от места наблюдения. Эта кратковременная встреча вида меняет представление о путях его миграций, прежде считавшихся идущими вдоль гор.

Е.С. Чаликова
Жабагылы