

- Мешкова Н.Н. 2003. Поведенческие адаптации птиц и млекопитающих к транспортным магистралям крупного города (на примере г. Москвы) // *Животные в городе*. М.: 135-138.
- Нумеров А.Д., Бардин А.В. 2013. О хищническом поведении серой вороны *Corvus cornix* // *Рус. орнитол. журн.* **22** (942): 3173-3181.
- Рахилин В.К. (2002) 2012. Хищническое поведение врановых птиц // *Рус. орнитол. журн.* **21** (793): 2208-2209.
- Резанов А.Г. 1984. О хищничестве серых ворон // *Экология, биоценотическое и хозяйственное значение врановых птиц*. М.: 175-177.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1112: 722-723

О залёте щуров *Pinicola enucleator* в Северо-Казахстанскую область зимой 2014/15 года

И.А.Зубань, М.Н.Калашников

Иван Александрович Зубань, Михаил Николаевич Калашников. Кафедра общей биологии, Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева, ул. Пушкина, д. 86, Петропавловск, 150000, Казахстан. E-mail: zuban_ia@mail.ru; janajmwjakamd@mail.ru

Поступила в редакцию 12 февраля 2015

Согласно В.К.Рябицеву (2008), щур *Pinicola enucleator* населяет среднюю и северную тайгу до пойменных лесов в лесотундре. На зиму птицы откочёвывают южнее, вплоть до лесостепи и степи. В Казахстане щур гнездится на юго-западном Алтае, где населяет кедровые и кедрово-пихтовые леса, иногда с примесью ели или лиственных деревьев, и является очень редким оседлым видом. На кочёвках в период с 1888 по 1959 год щур отмечался в Алматинской, Карагандинской и Уральской областях Казахстана (Кузьмина 1974).

В 2014 году щуры впервые отмечены и в Северо-Казахстанской области. 8 ноября стайка из 9 щуров наблюдалась на кустах ивы у окраины села Токуши Аккайынского района (рис. 1). Спустя две недели, 23 ноября, стайка из 6 птиц (1 самец и 5 самок) отмечены в небольшом сквере в центре Петропавловска, рядом со станцией юных натуралистов. Третья встреча щуров отмечена нами 15 декабря 2014 в посадке дикой яблони на окраине парка культуры и отдыха Петропавловска. Четыре птицы (1 самец и 3 самки) активно перемещались с ветки на ветку, расклёвывая плоды «дички» и доставая семена (рис. 2).

В январе-феврале 2015 года стайки, насчитывающие от 3 до 24 щуров, встречались в посадках лиственниц у городского драматического театра, на деревьях дикой яблони в юго-восточной и северо-западной частях города, в городском парке, а также в селе Токуши.



Рис. 1. Самка щура *Pinicola enucleator*, село Токуши, 8 ноября 2014.
Фото М.Н.Калашникова.



Рис. 2. Самец щура *Pinicola enucleator*, Петропавловск, Северо-Казахстанская область. 15 декабря 2014.
Фото М.Н.Калашникова.

Литература

- Рябицев В.К. 2008. *Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель*. Екатеринбург: 1-633.
Кузьмина М.А. 1974. Род Щур // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, 5: 318-320.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1112: 723-727

О залётах птиц в район Печоро-Илычского заповедника

Е.Н.Теплова

Второе издание. Первая публикация в 1955*

Для Печоро-Илычского заповедника, расположенного в верхнем течении реки Печоры, известно 198 видов птиц. Около 13% их появляется в районе заповедника очень редко. Настоящая статья является краткой сводкой всех имеющихся в моем распоряжении сведений о залётах птиц в район Печоро-Илычского заповедника.

Columba livia. Единственный экземпляр наблюдался мной с 6 по 9 мая 1949 года в посёлке Якша на берегу реки Печоры.

Columba oenas. В.Дормидонтов наблюдал пару клинтухов в 1934 году с 29 апреля по 1 мая на полях близ села Усть-Илыча, а также в

* Теплова Е.Н. 1955. О залётах птиц в район Печоро-Илычского заповедника // *Тр. Бюро кольцевания* 8: 174-176.