

ISSN 0869-4362

Русский
орнитологический
журнал

2018
XXVII



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1588
EXPRESS-ISSUE

2018 № 1588

СОДЕРЖАНИЕ

- 1485-1495 Орнитологические наблюдения в Приморском крае в 2017 году. Ю. Н. ГЛУЩЕНКО, В. Н. СОТНИКОВ, Д. В. КОРОБОВ, С. Ф. АКУЛИНКИН, В. М. МАЛЫШОК
- 1495 Наблюдение выводка камышницы *Gallinula chloropus* в пойме реки Талас у города Тараз (Южный Казахстан). Н. Н. БЕРЕЗОВИКОВ
- 1496 Залёт розового пеликана *Pelecanus onocrotalus* в Северо-Казахстанскую область в 2016 году. И. А. ЗУБАНЬ, В. С. ВИЛКОВ
- 1497-1504 Данные о случаях размножения пеганки *Tadorna tadorna* и современный статус вида в восточной части Финского залива. С. А. КОУЗОВ, А. В. ЛОСЕВА
- 1504-1506 Фенологические наблюдения над зелёной пересмешкой *Hippolais icterina* в Новоржевском районе Псковской области. Э. В. ГРИГОРЬЕВ
- 1506-1507 К биологии ремеза *Remiz pendulinus* в пойме реки Десны. В. М. БАБКО
- 1507-1508 Находка первого гнезда соловья-белошейки *Irania gutturalis* в горах Согеты. А. Д. ДЖАНЫСПАЕВ, А. В. КОВАЛЕНКО, О. В. БЕЛЯЛОВ
- 1508-1509 О гнездовании большой белой цапли *Casmerodius albus* в Ярославской области. В. А. СИМОНОВ
- 1509 Первая регистрация залётной лесной завирушки *Prunella modularis* в Восточном Казахстане. Б. В. ЩЕРБАКОВ
-

Редактор и издатель А. В. Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

2018 № 1588

CONTENTS

- 1485-1495 Ornithological observations in the Primorsky Krai in 2017.
Y u . N . G L U S H C H E N K O , V . N . S O T N I K O V ,
D . V . K O R O B O V , S . F . A K U L I N K I N ,
V . M . M A L Y S H O K
- 1495 Observation of the common moorhen *Gallinula chloropus*
brood in the floodplain of the Talas River near Taraz
(Southern Kazakhstan). N . N . B E R E Z O V I K O V
- 1496 The records of the great white pelican *Pelecanus onocrotalus*
in the North-Kazakhstan Oblast in 2016. I . A . Z U B A N ,
V . S . V I L K O V
- 1497-1504 Data on breeding cases of the common shelduck *Tadorna*
tadorna and the current status of the species in the eastern part
of the Gulf of Finland. S . A . K O U Z O V , A . V . L O S E V A
- 1504-1506 Phenological observations of the icterine warbler *Hippolais*
icterina in the Novorzhevsky Raion, Pskov Oblast.
E . V . G R I G O R I E V
- 1506-1507 To biology of the Eurasian penduline tit *Remez pendulinus*
in the floodplain of the Desna River. V . M . B A B K O
- 1507-1508 Finding the first nest of the iraniana *Irania gutturalis*
in the Sogety Mountains. A . D . D Z H A N Y S P A E V ,
A . V . K O V A L E N K O , O . V . B E L Y A L O V
- 1508-1509 On breeding of the great egret *Casmerodius albus*
in the Yaroslavl Oblast. V . A . S I M O N O V
- 1509 The first record of vagrant dunnock *Prunella modularis*
in Eastern Kazakhstan. B . V . S H C H E R B A K O V
-

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

Орнитологические наблюдения в Приморском крае в 2017 году

Ю.Н.Глущенко, В.Н.Сотников, Д.В.Коробов,
С.Ф.Акуликин, В.М.Малышок

Юрий Николаевич Глущенко. Дальневосточный Федеральный университет, Школа педагогики, ул. Некрасова, д. 35, г. Уссурийск, 692500, Россия. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, ул. Радио, д. 7, г. Владивосток, 690041, Россия. E-mail: yu.gluschenko@mail.ru

Владимир Несторович Сотников. Кировский городской зоологический музей, ул. Ленина, д. 179, г. Киров, 610007, Россия. E-mail: sotnikovkgzm@gmail.com

Дмитрий Вячеславович Коробов. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, ул. Радио, д. 7, г. Владивосток, 690041, Россия. E-mail: dv.korobov@mail.ru

Сергей Фёдорович Акуликин. Даровской районный краеведческий музей, ул. Советская, д. 35, пгт. Даровской, Кировская область, 612140, Россия. E-mail: darmuz@bk.ru

Валерий Михайлович Малышок. Красный проспект, д. 7, кв. 31, г. Шостка, Сумская область, Украина. E-mail: yuliya77@meta.ua

Поступила в редакцию 10 марта 2018

Материал для данного сообщения собран авторами в течение 2017 года в центральных и южных районах Приморского края на территории Спасского, Черниговского, Хорольского, Уссурийского, Октябрьского, Надеждинского и Хасанского районов. Данные о шелкоистом скворце опубликованы ранее (Сотников и др. 2017), а некоторые другие наиболее интересные, на наш взгляд, сведения приведены ниже. Номенклатура таксонов по: Коблик и др. 2006.

Японский баклан *Phalacrocorax capillatus*. Принято считать, что японский баклан целиком связан с морскими побережьями, проникая лишь в устья рек и на прибрежные озёра (Шунтов 1998; Литвиненко 2011; Елсуков 2013; Глущенко и др. 2016). Однако, по данным В.П. Шохрина (2017), весной по реке Киевке эти бакланы могут проникать до уровня села Лазо (расположено по прямой не менее чем в 45 км от берега Японского моря). 1 сентября 2017 К.Ю.Тучин встретил первогодка японского баклана на небольшом озере в окрестностях Уссурийска (рис. 1), что по прямой составляет около 60 км до ближайшего морского побережья.

Китайский волчок *Ixobrychus sinensis*. Редкий гнездящийся вид Приморского края, гнездовая биология которого здесь изучена крайне слабо, в частности, были даны описания только пяти найденных гнёзд (Гамова и др. 2011; Глущенко и др. 2016б). Два из этих гнёзд обнаружены нами в июле 2016 года на озере на окраине посёлка Хасан. В той же части озера 26 июня 2017 было осмотрено ещё два гнезда, расстояние между которыми составляло около 50 м. В первом гнезде было 6 насиженных яиц, а во втором – 2 яйца. Второе гнездо повторно было

проверено 30 июня и в нём оказалось 5 ненасиженных яиц, а у гнезда была поймана самка, в яйцеводе которой находилось готовое к откладке (шестое) яйцо. Помимо этого, в её яйчнике хорошо просматривались шесть лопнувших фолликул и три зрелые яйцеклетки (диаметр 13.0; 10.3 и 8.8 мм). Размеры этих фолликул позволяют предполагать, что через несколько дней яйца могли бы сформироваться, то есть полная кладка теоретически могла составить 9 яиц.




Рис. 1. Японский баклан *Phalacrocorax capillatus*. Окрестности Уссурийска.
1 сентября 2017. Фото К.Ю.Тучина.

Колпица *Platalea leucorodia*. Для Приморского края гнездование колпицы известно только для Приханкайской низменности и данное явление здесь носит эпизодический характер, при этом последние случаи находки гнёзд датированы 2012 годом, когда в многовидовой колонии цапель, размещённой в дельте реки Илистой, гнездились около 10 пар (Коробов и др. 2013). В 2013 году район этой колонии нам удалось посетить 12 апреля, при этом была отмечена группа из 4 колпиц, проявлявших явную привязанность к данной территории (Глущенко и др. 2016). В 2017 году, помимо данной колонии, колпицы, вероятно, гнездились у восточного побережья озера Ханка в районе устья реки Спасовки, поскольку 11 мая на рисовых полях в окрестностях села Луговое насчитывалось более 40 колпиц, а 13 мая в том же районе в двух группах суммарно было учтено 52 особи, большинство которых были взрослыми. Это максимальное число колпиц, известное для Ханка, во всяком случае начиная с середины XX века. Судя по датам встреч и

возрасту этих птиц, их никак нельзя отнести к категории пролётных, поскольку весенние миграции взрослых колпий в Приморском крае проходят главным образом в первой половине апреля (Глущенко и др. 2006). При повторном посещении этого района 22 мая здесь кормилось около 16 неполовозрелых особей, периодически курсировавших в северо-западном направлении (в сторону побережья Ханка) и обратно.

Хохлатый орёл *Nisaetus nipalensis*. Редкий и очень скрытный оседлый вид Приморского края, гнездовая биология которого изучена очень слабо. В восточных отрогах Борисовского (Шуфанского) плато в бассейне реки Ананьевки (Эльдуга) в 1995-2000 годах отмечалось гнездование 2-3 пар, а в 2000-е годы на северном участке этого плато численность составила не более 8 пар (Нечаев, Харченко 2012). В отрогах этого плато хохлатые орлы были встречены нами в бассейнах рек Грязная и Клёпочная. В первом одну особь наблюдали 18 мая 2017. Во втором бассейне два гнезда обнаружены 26 мая 2016. Они располагались на расстоянии около 50 м друг от друга и явно принадлежали одной и той же паре птиц. Птенцов в гнёздах не было, но, судя по наличию высохших ветвей хвойных деревьев, птицы гнездились в них в предыдущие годы. Повторно мы посетили этот участок 3 апреля 2017. В одном из этих гнёзд, расположенном на тополе Максимовича на высоте 21 м, птица насиживала кладку, состоящую из 1 яйца (рис. 2). Яйцо оказалось слабо насиженным и имело грязновато-белую окраску (рис. 3), что было явно обусловлено результатом насиживания (испачкалось).



Рис. 2. Самка хохлатого орла *Nisaetus nipalensis*, насиживающая кладку. Бассейн реки Клёпочной, отроги Борисовского плато, Приморский край. 3 апреля 2017. Фото Д.В.Коробова.

Размеры яйца 69.51×57.38 мм; вес 118.25 г. Диаметр гнезда 112×90, толщина 63 см. Гнездо было построено из сучьев и веток разного размера, а в лотке лежали зелёные лапы кедровой сосны *Pinus koraiensis* и несколько перьев хохлатого орла. Насиживание было очень плотным, а во время осмотра гнезда взрослые птицы с беспокойным криком летали вокруг, периодически атакуя большеклювых ворон *Corvus macrorhynchos* (рис. 4).



Рис. 3. Кладка хохлатого орла *Nisaetus nipalensis*. 3 апреля 2017. Фото Д.В.Коробова.



Рис. 4. Самка хохлатого орла *Nisaetus nipalensis*, атакующая пару большеклювых ворон *Corvus macrorhynchos*. Бассейн реки Клёпочной. 3 апреля 2017. Фото Д.В.Коробова.

Реликтовая чайка *Larus relictus*. Ранее реликтовая чайка в Приморском крае была зарегистрирована лишь однажды, когда одиночная взрослая птица в зимнем наряде была встречена на побережье Хасанского района у мыса Островок Фальшивый 29 сентября 1996 (Литвиненко, Шибает 1999). 4 ноября 2017 одиночная особь в первом зимнем наряде (рис. 5) в течение более часа кормилась на илистых отмелях бухты Нарва (Сидими). Она держалась несколько обособленно от находящейся здесь же группы озёрных чаек *Larus ridibundus*, на непродолжительное время присоединяясь к ним, при этом, в отличие от последних, она добывала корм, исключительно бродя по отмелям, обнажившимся во время отлива.



Рис. 5. Реликтовая чайка *Larus relictus* в первом зимнем наряде. Приморский край, бухта Нарва (Сидими). 3 апреля 2017. Фото Д.В.Коробова.

Короткохвостая горлица *Streptopelia tranquebarica*. Впервые для Приморья молодая самка короткохвостой горлицы была добыта на острове Аскольд осенью 1876 года (Шульпин 1936). С тех пор этот вид регистрировали здесь не менее 10 раз, но при этом не было зарегистрировано ни одной летней встречи (Глуценко и др. 2016а). На окраине посёлка Хасан самца наблюдали 6 июня 2017.

Восточный ширококорот *Eurystomus orientalis*. Несмотря на то, что в Приморском крае ширококорот не представляет большой редкости, его гнездовая биология изучена достаточно слабо. Считается, что этот вид

гнездится в дуплах деревьев (Воробьёв 1954; Литвиненко 1960; Спангенберг 1965; Пукинский 2003), но может занимать сорочьи гнёзда (Судиловская 1951) и искусственные гнездовья (del Noyo *et al.* 2001).

9 июня 2017 на окраине села Чернятино (Октябрьский район) нами было осмотрено гнездо восточного ширококорота, размещённое в нише кирпичной стены полуразрушенного здания, вход в которую располагался на высоте около 10 м над поверхностью земли (рис. 6).



Рис. 6. Гнездо ширококорота *Eurystomus orientalis* в нише кирпичной стены полуразрушенного здания. Село Чернятино, Западное Приморье. 9 июня 2017. Фото Д.В.Коробова.

В гнезде было 4 ненасиженных яйца. Следует отметить, что ширококороты заняли эту нишу после того как 27 апреля 2017 нами из неё была коллектирована кладка даурской галки *Corvus dauuricus*. Два других гнезда ширококорота в 2017 году обнаружены нами в окрестностях села Меркушовка (Черниговский район) 18 июня. Одно из них располагалось в покинутом дупле желны *Dryocopus martius*, которое было устроено в живой осине на высоте около 14 м, и содержало 3 насиженных яйца и один болтун. Другое гнездо располагалось в брошенном дупле дятла (судя по диаметру летка, вероятно, белоспинного *Dendrocopos leucotos*) на высоте около 10 м и содержало 4 слабо насиженных яйца. Поскольку данных о гнёздах рассматриваемого вида из пределов России очень мало, приведём ещё одну находку, сделанную нами также в окрестностях Меркушовки 1 июля 2016. Гнездо располагалось в покинутом дупле желны на высоте около 14 м. В нём было обнаружено 3 слабо насиженных яйца.

Размеры яиц всех выше перечисленных четырёх кладок ($n = 15$): 33.4-36.3×27.6-29.6, в среднем 34.97×28.45 мм; вес свежих и слабо насиженных яиц ($n = 11$): 13.3-16.0, в среднем 15.01 г.

Береговушка *Riparia riparia*. Размещение колоний береговушек в Приморье носит крайне локальный характер, её гнездовая биология до сих пор изучена очень слабо, а гнёзда не описаны. В 2017 году нами обследована крупная колония, расположенная на реке Раздольной (Суйфун) в окрестностях села Загородное (Уссурийский городской округ). Это поселение, занимавшее крутой левый берег нижнего течения реки (рис. 7), было обнаружено 30 мая.



Рис. 7. Колония береговушки *Riparia riparia*. Берег реки Раздольной в окрестностях села Загородное. 7 июня 2017. Фото Д.В. Коробова.

Колония включала около 260 гнездовых нор, расположенных в один, реже в два ряда. Высота вертикальной части обрыва составляла 150-180 см, а норы размещались лишь в его предвершинной части, обычно в 40-70 см от верхнего края. В день обнаружения с помощью эндоскопа удалось осмотреть содержимое 65 нор, при этом 23 норы оказались не законченными (во всяком случае, они не содержали материала гнездовой постройки), 28 нор были с гнёздами, но яйца в них ещё отсутствовали, в 9 гнёздах было по 1 яйцу, а в оставшихся пяти — по 2 яйца. Размеры готовых (содержащих материал гнездовой постройки) гнездовых нор ($n = 36$), см: глубина 41-106, в среднем 67.1; вертикальный диаметр летка 3-6, в среднем 4.53; горизонтальный диаметр летка 4.5-10, в среднем 6.11. При вторичном посещении коло-

нии 7 июня осмотрено 11 гнёзд. Их содержимое включало: 4 ненасиженных яйца (3 гнезда), 5 ненасиженных яиц (5), 6 ненасиженных яиц (1), 4 слабо насиженных яйца (1) и 5 слабо насиженных яиц (1). Гнёзда были сооружены главным образом из достаточно длинных сухих стеблей трав, в ряде случаев с различным количеством перьев (рис. 8).



Рис. 8. Гнёзда береговушки *Riparia riparia*. Берег реки Раздольной в окрестностях села Загородное. 7 июня 2017. Фото Д.В. Коробова.

Размеры гнездовых построек ($n = 11$), мм: диаметр 70-150, в среднем 106; диаметр лотка 45-60, в среднем 51; толщина гнезда 25-45, в среднем 36; глубина лотка 15-25, в среднем 20. Размеры яиц ($n = 51$), мм: $15.5-18.7 \times 11.3-12.7$, в среднем 16.83×12.09 ; вес свежих и слабо насиженных яиц ($n = 51$), г: 1.1-1.4, в среднем 1.24.

Короткопалый бюльбюль *Microscelis amaurotis*. После первой в Приморском крае встречи короткопалого бюльбюля 30 сентября 1960 (Лабзюк 1963) он был зарегистрирован здесь ещё более 20 раз (Глущенко и др. 2016а). В 2017 году наши с ним встречи были наиболее частыми, а порой и весьма продолжительными, что свидетельствует о регулярной дисперсии короткопалого бюльбюля в холодное время года далеко к северу от известной области гнездования с последующей возможной успешной зимовкой. Так, на восточной окраине города Уссурийска одну особь (рис. 9) впервые встретили 3 января 2017, а затем она регулярно появлялась на кормушке вплоть до 14 апреля. Ещё одного бюльбюля наблюдали у восточного побережья озера Ханка в районе Берёзовых озёр 17 октября 2017 (рис. 10).



Рис. 9. Короткопалый бюльбюль *Microscelis amaurotis*.
Восточная окраина Уссурийска. 14 февраля 2017. Фото Д.В.Коробова.



Рис. 10. Короткопалый бюльбюль *Microscelis amaurotis*.
Восточное побережье озера Ханка. 17 октября 2017. Фото Ю.Н.Глущенко.

Согласно письменному сообщению Ю.Б.Шибнева, в заповеднике «Кедровая Падь» группы из 7 и 3 короткопалых бюльбюлей были зарегистрированы 22 октября, а ещё две птицы встречены нами на восточной окраине этого заповедника 21 ноября.

Авторы выражают благодарность Е.А.Ашихмину, Ю.И.Глушаку, М.В.Погибе и И.М.Тиуну за помощь при проведении экспедиционных работ, а также К.Ю.Тучину за представленные фотографии японского баклана.

Л и т е р а т у р а

- Воробьёв К.А. 1954. *Птицы Уссурийского края*. М.: 1-360.
- Гамова Т.В., Сурмач С.Г., Бурковский О.А. 2011. Первое свидетельство гнездования китайского волчка *Ixobrychus sinensis* на юге Дальнего Востока // *Рус. орнитол. журн.* **20** (676): 1487-1496.
- Глущенко Ю.Н., Липатова Н.Н., Мартыненко А.Б. 2006. *Птицы города Уссурийска: фауна и динамика населения*. Владивосток: 1-264.
- Глущенко Ю.Н., Нечаев В.А., Редькин Я.А. 2016а. *Птицы Приморского края: краткий фаунистический обзор*. М.: 1-523.
- Глущенко Ю.Н., Сотников В.Н., Вялков А.В., Акуликин С.Ф., Коробов Д.В. 2016б. Новые данные о гнездовании китайского волчка *Ixobrychus sinensis* в Приморском крае // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1325): 3033-3038.
- Елсуков С.В. 2013. *Птицы Северо-Восточного Приморья: Неворобьиные*. Владивосток: 1-536.
- Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. 2006. *Список птиц Российской Федерации*. М.: 1-281.
- Коробов Д.В., Глущенко Ю.Н., Коробова И.Н. 2013. Гнездование колпицы *Platalea leucorodia* на озере Ханка: история, проблемы и перспективы // *Рус. орнитол. журн.* **22** (901): 1975-1978.
- Лабзюк В.И. (1963) 2006. Первая находка рыжеухого бюльбюля *Microscelis amaurotis* в южном Приморье // *Рус. орнитол. журн.* **15** (328): 802.
- Литвиненко Н.М. (1969) 2009. К экологии восточного широкогорота *Eurystomus orientalis* // *Рус. орнитол. журн.* **18** (506): 1451-1456.
- Литвиненко Н.М. 2011. Японский, или уссурийский баклан *Phalacrocorax capillatus* (Temminck et Schlegel, 1849) // *Птицы России и сопредельных регионов: Пеликанообразные, Аистообразные, Фламингообразные*. М.: 83-95.
- Литвиненко Н.М., Шибаев Ю.В. 1999. Новые орнитологические находки и наблюдения на крайнем юго-западе Приморья // *Рус. орнитол. журн.* **8** (71): 9-16.
- Нечаев В.А., Харченко В.А. 2012. Современное распространение и особенности биологии восточного хохлатого орла (*Spizaetus nipalensis orientalis* Temminck et Schlegel, 1844) в России // *Вестн. КрасГАУ* **5**: 238-244.
- Пукинский Ю.Б. 2003. Гнездовая жизнь птиц бассейна реки Бикин // *Тр. С.-Петербур. общ-ва естествоиспыт.* **4** (86): 1-267.
- Сотников В.Н., Акуликин С.Ф., Глущенко Ю.Н., Шохрин В.П. 2017. К вопросу о статусе шелковистого скворца *Sturnus sericeus* в Приморском крае // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1533): 5059-5062.
- Спангенберг Е.П. (1964) 2014. Птицы бассейна реки Имана // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1065): 3383-3473.
- Судиловская А.М. 1951. Отряд сизоворонки или ракши *Coracia* или *Coraciiformes* // *Птицы Советского Союза*. М., **1**: 486-546.
- Шохрин В.П. 2017. *Птицы Лазовского заповедника и сопредельных территорий*. Лазо: 1-648.

- Шульпин Л.М. 1936. *Промысловые, охотничьи и хищные птицы Приморья*. Владивосток: 1-436.
- Шунтов В.П. 1998. *Птицы дальневосточных морей России*. Владивосток, 1: 1-423.
- Del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J. (eds.). 2001. *Handbook of the Birds of the World*. Barcelona, 6: 1-589.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1588: 1495

Наблюдение выводка камышницы *Gallinula chloropus* в пойме реки Талас у города Тараз (Южный Казахстан)

Н.Н.Березовиков

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Поступила в редакцию 9 марта 2018

В первом томе сводки «Птицы Казахстана» сведений о гнездовании камышницы *Gallinula chloropus* на подгорной равнине вдоль северного подножия Киргизского Алатау, включая долину реки Талас, не приводится (Долгушин 1960). Не находил её здесь летом 1957 года М.Н.Корелов (2007), специально занимавшийся изучением орнитофауны этого хребта. Единичное гнездование камышницы известно лишь на некоторых озёрах в соседних горах Малого Каратау (Губин, Карпов 1999; Колбинцев 2003).

В северных окрестностях города Тараз (бывший Джамбул) 23 августа 2012 на верхней террасе реки Талас перед Казпосёлком в глубоком котловане со стоячей водой на мелководье с зарослями осоки и рогоза наблюдался выводок из трёх оперённых самостоятельных птенцов, достигших до размеров взрослых птиц.

Л и т е р а т у р а

- Губин Б.М., Карпов Ф.Ф. 1999. Материалы по гнездящимся птицам озера Бийликуль (Южный Казахстан) // *Рус. орнитол. журн.* 8 (75): 3-13.
- Долгушин И.А. 1960. *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, 1: 1-470.
- Колбинцев В.Г. 2003. Водоплавающие и околоводные птицы водоёмов предгорий Малого Каратау (Южный Казахстан) // *Selevinia*: 98-108.
- Корелов М.Н. 2007. Орнитологические наблюдения в Киргизском Алатау в 1957 г. // *Каз. орнитол. бюл.*: 254-264.



Залёт розового пеликана *Pelecanus onocrotalus* в Северо-Казахстанскую область в 2016 году

И.А.Зубань, В.С.Вилков

Иван Александрович Зубань. Владимир Семёнович Вилков. Кафедра общей биологии, Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева, ул. Пушкина, д. 87, Петропавловск, 150000, Казахстан. E-mail: zuban_ia@mail.ru; vsvilkov@mail.ru

Поступила в редакцию 11 марта 2018

По сообщению рыбаков В.Казабаева и А.Дробышева, с 22 по 25 июня 2016 на озере Курганское Жамбылского района держалась стая розовых пеликанов *Pelecanus onocrotalus* из 37 птиц. В этот же период 4 птицы были обнаружены погибшими в рыболовных сетях и были брошены на берегу озера. Осмотрев останки 3 птиц (крылья с перьями, частично туловище) в августе этого же года мы можем с полной уверенностью утверждать, что это действительно были розовые пеликаны: маховые перья имели полностью угольно-чёрный цвет с чёткой границей, отделяющей их от кроющих, на белом фоне остальной части крыла и туловища прослеживался хорошо выраженный розовый оттенок.

С погибших птиц были взяты плечевые кости и переданы для определения аспиранту и сотруднику зоологического музея Тюменского университета М.Г.Митропольскому. Последующий сравнительный анализ морфологических и морфометрических характеристик (в сравнении с эталонной коллекцией О.В. и М.Г.Митропольских) также показал несомненную принадлежность этих костей *P. onocrotalus* (М.Г.Митропольский, устн. сообщение).

В конце июня 2016 года на озере Екатериновское Жамбылского района (в 8 км южнее озера Курганское) житель села Макарьевка А.И.Зубань (устн. сообщ.) наблюдал стаю розовых пеликанов из 32 особей (вероятнее всего, это были те же самые птицы). Пеликанов рассматривали в 8-кратный бинокль с расстояния примерно в 150 м. Будучи охотником с многолетним стажем, хорошо знающим кудрявого пеликана *Pelecanus crispus*, ошибиться он не мог.

Встреча крупной стаи розовых пеликанов является первой одновременной регистрацией такого количества этих птиц на территории Северо-Казахстанской области.



Данные о случаях размножения пеганки *Tadorna tadorna* и современный статус вида в восточной части Финского залива

С.А.Коузов, А.В.Лосева

Сергей Александрович Коузов, Анна Владимировна Лосева. Биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия. E-mail: skouзов@mail.ru

Поступила в редакцию 11 марта 2018

Масштабные изменения ареалов водоплавающих птиц, наблюдающиеся с начала прошлого века (Кривенко 1991; Максимов, Ермаков 1985; Формозов 1959; Curry-Lindahl 1964), являются основной реакцией на динамику климата, обусловленную во многом циклами солнечной активности (Кривенко 1992; Шнитников 1969; Монин и др. 1979). На примере восточной части Финского залива, где этот процесс был наиболее заметен в течение последних 30 лет, хорошо видно, что у разных видов южного происхождения этот процесс протекает несинхронно. Такие виды, как лебедь-шипун *Cygnus cygnus*, серый гусь *Anser anser*, серая утка *Anas strepera*, стремительно заселили регион, стали одними из многочисленных или обычных видов на морских островах и побережьях, и их численность в последние десятилетия колеблется асимптотически в зависимости от погодных условий года (Бубырева и др. 1993; Бузун, Мераускас 1993; Коузов 2005а,б, 2016; Коузов, Кравчук 2014, 2013а, 2016; Коузов, Лосева 2016; Коузов и др. 2016; Рымкевич и др. 2012). Большой баклан *Phalacrocorax carbo* на протяжении последних 25 лет продолжает территориальную экспансию и увеличивает численность, и только в последние годы эта тенденция несколько замедлилась (Коузов 2007; Коузов, Гагинская 2013; Gaginskaya *et al.* 2014). Большая белая цапля *Casmerodius albus* только начинает в последние годы появляться в Ленинградской области на залётах и кочёвках (Богуславский 2010; Головань 2011; Барабанова и др. 2015; Головань и др. 2015; Домбровский 2015, 2017; Конечная 2016; Гребёнкин 2017; Коузов 2015а,б,в,г; Храбрый 2015). Нужно отметить, что в соседней Псковской области большая белая цапля в 2017 году впервые обнаружена на гнездовании (Фетисов 2017). В тоже время такие виды как пеганка *Tadorna tadorna*, чеграва *Hydroprogne caspia* и пестроногая крачка *Thalasseus sandvicensis* после регистрации первых достоверно гнездящихся пар (Бузун, Мераускас 1993; Бубырева и др. 1993; Коузов 1995) так и остались видами, гнездование которых либо представляет большую редкость (пеганка, чеграва), либо более не от-

мечается (пестроногая крачка) (Коузов, Кравчук 2013б; Коузов, Бубличенко 2015). Ситуация с этими видами требует особенного внимания орнитологов.

Первый случай гнездования пеганки в Ленинградской области отмечен в 1988 году на острове Ремисаар на Кургальском рифе у северного побережья Кургальского полуострова (Бузун, Мераускас 1993; Бубырева и др. 1993;). В дальнейшем, по нашим наблюдениям, одна пара пеганок гнездилась здесь до 1994 года (Коузов, Кравчук 2013). Экспедиции Биологического института Санкт-Петербургского университета в 1991-1992 и 1994-1995 годах выявили присутствие в первой половине лета пеганок у целого ряда островов восточной части Финского залива: Большой Тютерс, Мощный, Малый, Сескар и Большой Фискар (Васильева 2002; Иовченко и др. 2004; Носков и др. 1993). Вместе с тем ни в одной из этих экспедиций не отмечено хотя бы одного достоверного случая размножения пеганок (находки гнёзд или выводков). Везде в этих источниках речь идёт только о встречах брачных пар, на основании чего авторы предполагали высокую вероятность гнездования птиц (Васильева 2002; Иовченко и др. 2004; Носков и др. 1993). Более того, основываясь на этих опубликованных материалах, некоторые авторы сделали заключение о том, что численность гнездящихся в восточной части Финского залива пеганок составляет около 10 пар (Бузун 2015; Лыженков 2017).

Вместе с тем, на наш взгляд, подобная практика не корректна по отношению к виду, находящемуся у самой границы своего ареала, где для него могут быть характерны, во-первых, сильные межгодовые флуктуации, во-вторых, наличие большой доли неразмножающихся пар и групп из нескольких особей, подыскивающих территорию для вероятного будущего размножения. Такие особенности в характерны для многих крупных гусеобразных с длительным циклом индивидуального развития. Например, восточной части Финского залива это заметно у лебедя-шипуна (Коузов, Кравчук 2014; Коузов 2016; Коузов, Лосева 2016). Кроме того, пеганка – достаточно крупный, ярко окрашенный вид гусеобразных, выводки которого держатся на открытых мелководьях у побережья. То есть не заметить выводки пеганок на островах Финского залива там, где они есть, просто невозможно. Поскольку в экспедициях 1991-1996 годов работали высококвалифицированные орнитологи, то вероятнее всего, отсутствие встреч гнёзд и выводков свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве случаев они наблюдали неразмножающихся пеганок. С 1996 по 2005 год никаких серьёзных орнитологических обследований островов Финского залива не проводилось. Учитывая вышесказанное, становится ясным, что мнение о том, что в это время там размножалось до десятка пар пеганок (Бузун 2015), не имеет веских оснований.

По нашим наблюдениям на Кургальском полуострове в 2005-2017 годах, пеганки полностью отсутствовали в годы с холодной зимой и поздним развитием весенних событий – 2005-2006 и 2010-2013. Пеганки появлялись на песчаных отмелях около островов Кургальского рифа в годы с развитием кратковременных тёплых фаз климата июня. Так в мае-июне 2007-2009 годов их численность здесь варьировала от 2 пар до 17 птиц (рис. 1). В 2014-2017 годах первые птицы появлялись на мелководьях уже в конце марта, в начале мая в разные годы стаи пеганок насчитывали от 15 до 32 птиц (рис. 2), к началу июня в эти годы около островов Ремисаар и Хангелода обязательно оставалось 1-2 пары этих птиц. Однако несмотря на специальные поиски, ни одного случая размножения пеганки за эти годы здесь не отмечено. Учитывая ограниченность площадей островов Кургальского рифа и низкотравную растительность на них, вероятность пропуска гнезда или выводка пеганки здесь минимальна.



Рис. 1. Группа пеганок *Tadorna tadorna* у острова Ремисаар на Кургальском рифе. 16 мая 2008.



Рис. 2. Стая пеганок *Tadorna tadorna* у острова Сейнитлуда. 2 мая 2016.

После долгого перерыва достоверный случай размножения пеганки был отмечен в 2010 году на острове Малый Тютерс (Vysotskiy *et al*, 2010). В 2012 году пеганки здесь достоверно не гнездились из-за лис *Vulpes vulpes*, проникших на остров зимой по льду. Снова гнездование одной пары пеганок на этом острове удалось установить 23 июня 2014, когда на небольшом озерце у юго-западного мыса острова мы наблюдали выводок пеганки из двух птенцов приблизительно 10-дневного возраста (рис. 3 и 4). В 2016 году пеганки здесь не размножались.




Рис. 3. Пара пеганок *Tadorna tadorna* около выводка на внутреннем озере на острове Малый Тютерс. 23 июня 2014.



Рис. 4. Птенец пеганки *Tadorna tadorna* на внутреннем озере на острове Малый Тютерс. 23 июня 2014.

Вторым островом, где в последние годы достоверно удалось выявить гнездование пеганки, является остров Мощный. В начале августа 2014 года мы наблюдали пару пеганок с 7 подростками ещё нелётными птенцами в бухте Окольной в восточной части острова Мощный. В 2015 году 14-16 мая и 12-14 июня в бухте Защитной регулярно наблюдали 2 пары пеганок. После кормёжки на мелководье птицы отлетали на восточное побережье острова. 1 июня 2016 с небольшого островка Большой Косой у южной оконечности Мощного мы наблюдали пару пеганок, пролетевших в восточном направлении вдоль береговой линии острова. 17 июня 2017 на открытом каменисто-песчаном мелководье у восточного берега острова Мощный встречен выводок из 8 маленьких пуховичков при двух родителях.

Осенью 2017 года поступило сообщение о находке 20 августа на северо-западном берегу Выборгского залива ослабленной молодой пеганки, которая после нескольких дней передержки в неволе погибла (Лыженков 2017). Судя по фотографии в статье, молодая пеганка была в ювенильном наряде уже с полностью сформировавшимся полётным оперением. Поэтому местом её рождения не обязательно был именно Выборгский залив, куда она могла попасть в процессе послегнездовых перемещений. Однако с высокой долей вероятности эта птица родилась в восточном секторе Финского залива.

Таким образом, все имеющиеся к настоящему времени данные позволяют заключить, что восточная часть Финского залива является регионом, где пеганки появляются только периодически, в годы с наибольшим развитием кратковременных тёплых фаз климата. В такие годы весной и в начале лета здесь держится от одного до трёх десятков неразмножающихся птиц и не более 1-2 гнездящихся пар. Достоверно доказанными местами размножения пеганки в последние годы являются только острова Малый Тютерс и Мощный.

Л и т е р а т у р а

- Барабанова Е.Н., Шатенёв К.Г., Машкова Е.В. 2015. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на Раковых озёрах на Карельском перешейке // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1152): 2018-2021.
- Богуславский А.В. 2010. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на южном берегу Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **19** (542): 31.
- Бубырева В.А., Бузун В.А., Волкович Н.М., Коузов С.А., Шаповалова О.В., Шукин А.К. 1993. Отчёт Кургальской экспедиции Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей в полевой сезон 1992г. // *Вестн. С.-Петерб. ун-та* (Сер. 3. Биол.) **2**: 111-117.
- Бузун В.А. 2015. Краткий обзор миграций и гнездования водоплавающих птиц в восточной части Финского залива и на Ладожском озере // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1112): 729-731.
- Бузун В.А., Мераускас П. 1993. Орнитологические находки в восточной части Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **2**, 2: 253-259.
- Васильева Н.А., 2002. Материалы по летней орнитофауне архипелага Сескар в восточной части Финского залива // *Беркут* **11**, 1: 18-26.

- Головань В.И. 2011. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на южном берегу Лужской губы // *Рус. орнитол. журн.* **20** (663): 1143-1144.
- Головань В.И., Резвый С.П., Савинич И.Б. 2015. О встречах больших белых цапель *Casmerodius albus* на востоке Финского залива в 2013-2015 годах // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1190): 3339.
- Гребёнкин А.В. 2017. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на реке Хревица в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1490): 3563-3564.
- Домбровский К.Ю. 2015. Наблюдение большой белой цапли *Casmerodius albus* в деревне Струпово (низовья реки Луги) // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1153): 2059-2060.
- Домбровский К.Ю. 2017. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на Копанском озере в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1481): 3267-3268.
- Иовченко Н.П., Гагинская А.Р., Носков Г.А., Резвый С.П. (2004) 2017. Результаты орнитологического обследования островов Финского залива в 1994-1995 годах // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1528): 4884-4902.
- Ковалев В.А. 2013. Новый залёт большой белой цапли *Casmerodius albus* на восток Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **22** (946): 3291.
- Конечная Г.Ю. 2016. Осенние встречи большой белой цапли *Casmerodius albus* на озере Сяbero (Лужский район Ленинградской области) // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1236): 126-127.
- Коузов С.А. 1995. Первая регистрация гнездования пестроносой крачки *Thalasseus sandwicensis* в восточной части Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **4**, 1/2: 66-67.
- Коузов С.А. 2005. Адаптации к открытым морским мелководьям у лебедей-шипун, гнездящихся на Кургальском полуострове (восточная часть Финского залива) // *Материалы 3-го Международ. симп. «Гусеобразные Северной Евразии»*. СПб.: 42-43.
- Коузов С.А. 2005б. Адаптации к открытым морским мелководьям у серых гусей, гнездящихся на Кургальском полуострове (восточная часть Финского залива) // *Материалы 3-го Международ. симп. «Гусеобразные Северной Евразии»*. СПб.: 43-44.
- Коузов С.А. 2007. Большой баклан *Phalacrocorax carbo* на Кургальском полуострове: история вселения и особенности биологии // *Рус. орнитол. журн.* **16** (349): 339-365.
- Коузов С.А. 2010. Особенности биологии лебедя-шпун и серого гуся на Кургальском полуострове // *Казарка* **12**, 2: 85-113.
- Коузов С.А. 2015а. О характере пребывания большой белой цапли (*Casmerodius albus* L.) на Кургальском полуострове и сопредельных участках восточной части Финского залива в последнем десятилетии // *Вестн. С.-Петерб. ун-та* (Сер. 3. Биол.) **1**: 41-50.
- Коузов С.А. 2015б. Встреча больших белых цапель *Casmerodius albus* в плавнях Кронштадтской колонии осенью 2015 года // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1195): 3507-3509.
- Коузов С.А. 2015в. О существенном увеличении числа встреч летующих больших белых цапель *Casmerodius albus* на западном побережье Кургальского полуострова в 2014 и 2015 годах // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1191): 3353-3358.
- Коузов С.А. 2015г. О встречах большой белой цапли *Casmerodius albus* в долине реки Гороховки (Карельский перешеек) в июле 2015 года // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1189): 3299-3300.
- Коузов С.А. 2016. Лебедь-шипун (*Cygnus olor* Gmelin, 1789) в восточной части Финского залива: история расселения, распределение размножающихся птиц и биология размножения // *Вестн. С.-Петерб. ун-та* (Сер. 3. Биол.) **2**: 38-69.
- Коузов С.А., Бубличенко Ю.Н. 2015. Орнитокомплексы водно-болотных птиц восточной части Финского залива: современное состояние, тенденции динамики и антропогенные угрозы // *16-й Международ. экол. форум «День Балтийского моря»*. СПб.: 105-107.
- Коузов С.А., Гагинская А.Р. 2013. Особенности распределения и межсезонной динамики численности большого баклана (*Phalacrocorax carbo sinensis*) в восточной части Финского залива // 8-я регион. молодёжная экол. конф. «Экологическая школа в Пе-

тергофе – наукограде Российской Федерации: Экологические проблемы Балтийского региона». СПб.

- Коузов С.А., Кравчук А.В. 2013а. Серый гусь (*Anser anser* L.) в Ленинградской области: основные тенденции многолетних изменений численности, экология, миграции и перспективы реинтродукции // *Вестн. охотовед.* **10**, 1: 5-16.
- Коузов С.А., Кравчук А.В. 2013б. Основные особенности населения гусеобразных птиц прибрежной зоны Кургальского полуострова (восточная часть Финского залива) и его динамика в 1990-2010 годах // *Рус. орнитол. журн.* **22** (858): 723-724.
- Коузов С.А., Кравчук А.В. 2014. Особенности биологии лебедя-шипуна (*Cygnus olor*) в восточной части Финского залива // *Вестн. охотовед.* **11**, 2: 119-204.
- Коузов С.А., Кравчук А.В. 2016. Особенности пространственного распределения и территориальной структуры гнездящейся группировки лебедя-шипуна *Cygnus olor* в Ленинградской области и определяющие их факторы среды // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1249): 556-557.
- Коузов С.А., Лосева А.В. 2016. Современное распространение, новые места размножения и линьки лебедя-шипуна (*Cygnus olor* Gmelin) в Ленинградской области по данным 2005-2015 гг // *Вестн. С.-Петерб. ун-та* (Сер. 3. Биол.) **1**: 116-136.
- Коузов С.А., Рычкова А.Л., Кравчук А.В. 2016. Лебедь-шипун // *Миграции птиц Северо-Запада России. Неворобьиные*. СПб.: 110-113.
- Кривенко В.Г. 1991. *Водоплавающие птицы и их охрана*. М.: 1-270.
- Кривенко В.Г. 1992. Концепция внутривековой и многовековой изменчивости климата как предпосылка прогноза // *Климаты прошлого и климатический прогноз*. М.: 39-40.
- Лыженков В.В. 2017. Находка молодой пеганки *Tadorna tadorna* в Выборгском районе Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1492): 3627-3628.
- Максимов А.А., Ермаков Л.Н. 1985. *Циклические процессы в сообществах животных (биоритмы, сукцессии)*. Новосибирск: 1-227.
- Монин А.С., Шишков Ю.А. 1979. *История климата*. Л.1-408.
- Носков Г.А., Фёдоров В.А., Гагинская А.Р., Сагитов Р.А., Бузун В.А. 1993. Об орнитофауне островов восточной части Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **2**, 2: 163-173.
- Рымкевич Т.А., Носков Г.А., Коузов С.А., Уфимцева А.А., Зайнагутдинова Э.М., Стариков Д.А., Рычкова А.Л., Иовченко Н.П. 2012. Результаты синхронных учётов мигрирующих птиц в Невской губе и прилежащих акваториях весной 2012 года // *Изучение динамики популяций мигрирующих птиц и тенденций их изменений на Северо-Западе России*. СПб.: 70-86.
- Фетисов С.А. 2017. Большая белая цапля *Casmerodius albus* – новый гнездящийся вид Псковской области и Северо-Запада России // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1485): 3369-3387.
- Формозов А.Н. 1959. О движении и колебании границ распространения млекопитающих и птиц // *География населения наземных животных и методы его изучения*. М.: 201-221.
- Храбрый В.М. 2015. Наблюдения больших белых цапель *Casmerodius albus* в Лужском районе Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1230): 4631-4633.
- Шнитников А.В. 1969. *Внутривековая изменчивость компонентов общей увлажнённости*. Л.: 1-244.
- Curry-Lindahl K. 1964. The situation of ducks, geese and swans in Norway, Sweden and Finland // *Proc. 1st European Meeting on Wildfowl Conservation*. London; Le Sambuc: 62-73.
- Gaginskaya A., Starikov D., Kouzov S. 2014. Status of the breeding population of Great Cormorants in the Russian part of the Gulf of Finland in 2012 // *Breeding numbers of Great Cormorants Phalacrocorax carbo in the Western Palearctic, 2012-2013*. IUCN-Wetlands International Cormorant Research Group Report. Scientific report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus Univ. **99**: 171-174.

Vysotskiy V., Kondratiev A., Buzun V., Fedorov V., Ovcharenko V. 2010. *Ornithological investigations on the islands of the Russian part of the Gulf of Finland included into the area of «Ingermanlandskiy» State Nature Reserve*. Project report. The project is supported by Nord Stream AG: 1-35.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1588: 1504-1506

Фенологические наблюдения над зелёной пересмешкой *Hippolais icterina* в Новоржевском районе Псковской области

Э.В.Григорьев

Эдуард Вячеславович Григорьев. Деревня Дубровы, Новоржевский район, Псковская область, 182457, Россия. E-mail: edik.grigoriev2016@yandex.ru

Поступила в редакцию 9 марта 2018

Зелёная пересмешка *Hippolais icterina* – дальний мигрант, зимующий в Африке южнее экватора. На места гнездования она прилетает позже большинства наших птиц (Мальчевский, Пукинский 1983; Павевский 2012). Поскольку не издающих звуки зелёных пересмешек обнаружить довольно трудно, о времени прилёта мы могли судить только по первой песне, а сроки отлёта остались не прослеженными. Многолетние (1992, 1995-2016) фенологические наблюдения в Новоржевском районе Псковской области проводились в основном в окрестностях деревни Дубровы на юго-западе района (см. таблицу).

Фенологические наблюдения над зелёной пересмешкой *Hippolais icterina* в Новоржевском районе Псковской области

Годы	Первая песня	Начало массового пения	Последняя песня	Начало кладки в первых гнёздах
1992	14 мая	–	–	–
1995	14 мая	–	–	–
1996	–	–	19 июня	–
1997	12 мая	16 мая	9 июля	–
1998	10 мая	13 мая	11 июля	–
1999	19 мая	20 мая	2 июля	15 июня
2000	11 мая	18 мая	6 июля	8 июня
2001	5 мая	12 мая	2 июля	–
2002	5 мая	–	26 июня	–

Окончание таблицы

Годы	Первая песня	Начало массового пения	Последняя песня	Начало кладки в первых гнёздах
2003	9 мая	12 мая	3 июля	7 июня
2004	4 мая	17 мая	—	—
2005	15 мая	18 мая	12 июля	—
2006	13 мая	20 мая	—	—
2007	—	—	23 июня	10 июня
2008	24 мая	26 мая	—	—
2009	17 мая	—	4 июля	—
2010	12 мая	14 мая	26 июня	—
2011	14 мая	17 мая	3 июля	18 июня
2012	8 мая	11 мая	1 июля	15 июня
2013	15 мая	19 мая	1 июля	—
2014	10 мая	15 мая	30 июня	31 мая
2015	5 мая	9 мая	23 июня	—
2016	15 мая	18 мая	1 июля	—



Гнездо зелёной пересмешки *Hippolais icterina* на серой ольхе, облицованное снаружи полосками тонкой коры берёзы. Опушка ольхово-берёзового колка. Урочище Незнаниха. Новоржевский район, Псковская область.
26 июня 2011. Фото автора.

Первая песня зелёной пересмешки в среднем за 21 год регистрировалась 12 мая. Самая ранняя дата — 5 мая 2001, 2002 и 2015, самая

поздняя – 24 мая 2008. Массовое пение в среднем за 17 лет начиналось 16 мая; самая ранняя дата – 9 мая 2015, самая поздняя – 26 мая 2008. Последняя песня в среднем за 18 лет регистрировалась 1 июля; самая ранняя дата – 19 июня 1996, самая поздняя – 12 июля 2005.

Начало кладки в первых гнёздах в среднем за 7 лет приходилось на 10 июня. Самая ранняя дата появления первого яйца – 31 мая 2014, самая поздняя – 18 июня 2011 (см. рисунок).

Литература

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., 2: 1-504.

Паевский В.А. 2012. Птицы России и сопредельных стран: зелёная пересмешка *Hippolais icterina* // *Рус. орнитол. журн.* 21 (815): 2813-2841.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1588: 1506-1507

К биологии ремеза *Remiz pendulinus* в пойме реки Десны

В.М.Бабко

*Второе издание. Первая публикация в 1983**

Исследования гнездовой ремезы *Remiz pendulinus* проводились в пойме Десны от села Евминка до села Лебедевка Козелецкого района юго-западной части Черниговской области. Обследованная территория занимает 420 км² равнинной местности с пойменными лугами и многочисленными озёрами, с зарослями верб и тополей. Наводнение 1970 года создало благоприятные условия для безопасного гнездования и размножения ремеза в пойме Десны. В этот год гнездились 30 пар ремезов. В дальнейшем число гнёзд менялось следующим образом: 1971 год – 39, 1972 – 30, 1973 – 30, 1974 – 24, 1975 – 29, 1976 – 25, 1977 – 17, 1978 – 9, 1979 – 8, 1980 – 4 гнезда. Резкое уменьшение числа гнёзд в последние годы произошло из-за увеличившегося посещения угодий людьми и неблагоприятных погодных условий 1979 и 1980 годов (холодная затяжная весна).

По прилёте на места гнездования ремезы не сразу приступают к строительству гнезда. Лишь с распусканием почек на вербе они начинают выбирать места для устройства гнезда. Гнезда над водой устраиваются на высоте от 2 до 5 м, а над сушей – 8.5-11 м.

* Бабко В.М. 1983. К биологии ремеза в пойме р. Десны // *Орнитология* 18: 186.

Ремезы не ремонтируют гнёзда и не используют их на второй год. К глубокой осени гнёзда наполовину разрушаются под воздействием дождя и ветра. Зимой синицы, особенно лазоревки *Parus caeruleus*, разрывают гнёзда и ищут там спрятавшихся насекомых. Весной остатки гнёзд используют другие птицы для строительства своих гнёзд.

Злейшим врагом ремеза в исследуемом районе является серая ворона *Corvus cornix*. Неоднократно приходилось наблюдать, как ворона сбивает гнёзда ремеза крыльями, в первую очередь те, которые находятся над сушей. Упавшие гнёзда она здесь же разрывает и поедает их содержимое. Ремез, оставшись без гнезда, перемещается на несколько метров в сторону и приступает к строительству нового.

В выкармливании птенцов принимают участие оба родителя. В гнездо с птенцами на «Лаптевом острове» 8 июня 1976 взрослые ремезы приносили корм из рожи за старым руслом Десны с расстояния до 300-400 м 2-3 раза в минуту, всего 1608 прилётов. В основном это были зелёные гусеницы, собранные на осоках. После вылета птенцов ремезы ещё долго держатся семьями, но к концу августа отлетают.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1588: 1507-1508

Находка первого гнезда соловья-белошейки *Irania gutturalis* в горах Согеты

А.Д.Джаныспаев, А.В.Коваленко, О.В.Белялов

Второе издание. Первая публикация в 2004*

До последнего времени считалось, что в Казахстан заходит лишь незначительная часть ареала соловья-белошейки *Irania gutturalis*. На гнездовании этот соловей обнаружен по Угаму, Пскему, в северной части Таласского Алатау и западной части Киргизского Алатау. Многочисленная птица хребта Каратау, обитает в Боролдае, Беркаре, Чаяне, доходит на север до Мынжилков (Кузьмина 1970). В мае 1984 года соловей-белошейка впервые был найден в горах Малайсары в урочище Кербулак (Лапшин 2002).

В горах Согеты (восточные отроги Заилийского Алатау) 7 июня 2003 были встречены два самца белошейки. Один из них носил корм в направлении небольшого куста курчавки, растущего на крутом скалистом склоне, в 30 м от дна очень узкого отщелка. Между прилётами с

* Джаныспаев А.Д., Коваленко А.В., Белялов О.В. 2004. Находка первого гнезда соловья-белошейки в горах Согеты // *Каз. орнитол. бюл.*: 191.

кормом он стремительно преследовал приблизившихся к этому месту туркестанского жулана *Lanius phoenicuroides* и овсянку Стюарта *Emberiza stewarti*. 13 июня осмотрено гнездо с 5 слётками, которых продолжал кормить самец. Гнездо расположено внутри куста курчавки 0.5 м высотой в 0.2 м от земли. В этом же отщелке на промежутке в несколько сот метров встречено ещё 4 территориальных самца, причём трое из них пели.

Окружающие биотопы похожи на характерные места обитания соловья-белошейки в Каратау. Отщелок со скалистыми склонами с осыпями порос пятнами можжевельника казацкого и эфедры и отдельными кустами жимолости и курчавки, по дну ущелья – густые заросли таволги. Из птиц доминировали черные стрижи *Apus apus*, плешанки *Oenanthe pleschanka*, синие *Monticola solitarius* и пёстрые *M. saxatilis* каменные дрозды. Встречены выводки кеклика *Alectoris chukar* и филина *Bubo bubo*.

Л и т е р а т у р а

- Кузьмина М.А. 1970. Род соловей-белошейка – *Irania* // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, 3: 632-635.
- Лапшин Е.Н. 2002. Первое нахождение соловья-белошейки в горах Малайсары // *Каз. орнитол. бюл.*: 110.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1588: 1508-1509

О гнездовании большой белой цапли *Casmerodius albus* в Ярославской области

В.А.Симонов

Второе издание. Первая публикация в 2015*

В 2009 году большая белая цапля *Casmerodius albus* впервые загнездилась в колонии серых цапель *Ardea cinerea* на волжском острове Радовский (58°03' с.ш., 38°17' в.д.) в Некоузском районе Ярославской области (Голубев 2011; Гроот Куркамп 2014). Гнездо располагалось на дереве. С тех пор больших белых цапель там встречали ежегодно, но гнездование их больше никто не проверял. Только 6 июня 2015 Дмитрию Павлову (письм. сообщ.) удалось посетить колонию. По его словам, жилых гнёзд цапель там было 50-60 (может быть, и больше, но он не стал заходить вглубь колонии, чтобы не нервировать птиц). Он видел

* Симонов В.А. 2015. О гнездовании большой белой цапли в Ярославской области // *Московка* 22: 71.

трёх больших белых цапель, слетающих с гнёзд, а всего там кружили 5 птиц. К тому же в округе он видел ещё несколько белых цапель. По его оценкам, всего в колонии могло находиться до 10 пар. Таким образом, это самая северная точка гнездования большой белой цапли в европейской части России.

Л и т е р а т у р а

- Голубев С.В. 2011. Птицы Ярославского Поволжья и сопредельных регионов: история, современное состояние. Том 1. Неворобьиные (Non- Passeriformes). Ярославль: 1-684.
- Гроот Куркамп Х. (2014) 2015. Статус большой белой цапли *Casmerodius albus* в Московской области и на сопредельных территориях // *Рус. орнитол. журн.* 24 (1228): 4565-4572.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1588: 1509

Первая регистрация залётной лесной завирушки *Prunella modularis* в Восточном Казахстане

Б.В.Щербаков

*Второе издание. Первая публикация в 2008**

Лесная завирушка *Prunella modularis* встречается в Казахстане в период миграций в его западных частях, отдельные залёты известны для Наурзума и Кургальджино (Гаврилов 1999). Для востока Казахстана случаев её появления до последнего времени не регистрировалось. Одиночная лесная завирушка наблюдалась 2 мая 2006 в черте Усть-Каменогорска в стайке полевых воробьёв *Passer montanus*. При появлении мелкого хищника она затаилась среди ветвей ёлочки и подпустила на 40-60 см, боясь выдать себя. При попытке поймать её руками она перепрыгивала с ветки на ветку вокруг ствола и не улетала в течение 3-4 мин.



* Щербаков Б.В. 2008. Первый залёт лесной завирушки в Восточном Казахстане // *Каз. орнитол. бюл.*: 151.